

Bruntál, 10.7.2014

Odhad GF dle CKD-EPI

Vážená paní doktoro, pane doktore,

od **10.7.2014** Vám na výsledkovém listu za předpokladu, že byl stanovován kreatinin v séru provedeme automaticky výpočet odhadu glomerulární filtrace dle rovnice CKD-EPI. Rovnice CKD-EPI je doporučována odbornými společnostmi, protože poskytuje výsledky nejbližší reálné GF. Odhad GF dle MDRD, který jsme zavedli před 2 lety necháváme v platnosti, takže na výsledkovém listu budete mít oba tyto výpočty.

Výsledek je udáván v ml/s na 1,73 m², výpočet se neprovádí u osob mladších 18 roků.

Kategorie chronického selhání ledvin podle GF (ml/s)

| Kategorie GF | [ml.s] |
|---------------------|-------------------------|
| G1 | ≥ 1,50 |
| G2 | 1,0 až 1,49 |
| G3a | 0,75 až 0,99 |
| G3b | 0,5 až 0,74 |
| G4 | 0,25 až 0,49 |
| G5 | < 0,25 = selhání ledvin |

Podotýkám, že se jedná o výpočet, který není bodově ohodnocen a tudíž nezvyšuje nijak Vaše náklady.

Za kolektiv OKBH s pozdravem,

RNDr. Jaromír Soušek, Ph.D.